



CONDILOMAS ACUMINADOS

También conocidos como verrugas genitales, los condilomas acuminados se caracterizan por presentar un abultamiento (verruga) que puede aparecer tanto en piel como en mucosas, en especial en el área ano-genital. Habitualmente, se observan lesiones sueltas pero también pueden extenderse en forma de racimos.

CAUSAS

Enfermedad vírica de transmisión sexual producida por el **Virus del Papiloma Humano (VPH)**. Es la enfermedad de **transmisión sexual** más frecuente en nuestro país.

La forma más común de contagio son las **relaciones sexuales** con penetración vaginal y/o anal.

En **raras ocasiones**, puede producirse contagio a través de **objetos de aseo**, ropa interior, baños públicos, etc.

El momento del contagio **no puede establecerse claramente**, pudiendo ser desde un mes a varios años.

Si no son bien tratados, se pueden **contagiar a otras personas** o **autocontagiarse** (extenderse por las zonas cercanas).



PREVENCIÓN



Relaciones sexuales protegidas, utilizando preservativos.



Deben ser tratadas tanto la persona que los presenta como aquellas con las que se haya tenido contacto sexual.



Importante hacer un buen seguimiento, ya que pueden volver a salir.

TRATAMIENTO



TÓPICOS

Existen varias opciones. Son sustancias muy irritantes y deben usarse siempre bajo supervisión médica (dermatólogo o proctólogo, generalmente).

No deben usarse dentro del canal anal.



CIRUGÍA

Sin duda es el tratamiento más efectivo. Se realiza extirpación y/o fulguración bajo anestesia local. Nos permite, además, tomar muestras para biopsia. Los objetivos de la biopsia son confirmar el diagnóstico, determinar la existencia o no de displasia y valorar el serotipo de virus.



CRIOTERAPIA

Consiste en la cauterización por frío de las verrugas usando una pistola de nitrógeno líquido.

Se utiliza si hay pocas lesiones y si son externas.

No puede usarse en el interior del canal anal o genitales internos femeninos.

No permite la toma de biopsias.

SEGUIMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL SEROTIPO DEL VPH

Se han identificados **múltiples tipos** de este virus, aunque solo algunos son capaces de infectar el tracto genital.

Este virus es también responsable del **cáncer de cuello de útero** en la mujer y de algunos casos de **cáncer de ano** en hombres y mujeres, especialmente en la población homosexual masculina.

La capacidad de desarrollar un cáncer está relacionada con el tipo de VPH, existiendo **serotipos de bajo riesgo y de alto riesgo**.

Por tanto, la identificación del tipo de VPH mediante **biopsia** de las lesiones es muy importante para establecer el pronóstico y los controles médicos adecuados. Asimismo, la biopsia nos informará de la existencia o no de **displasia** (lesión premaligna que deberemos vigilar).

Es fundamental acudir a las revisiones que le indique su especialista para detectar las posibles recidivas, que son muy frecuentes en esta patología.

TENER CONDILOMAS NO ES UNA ENFERMEDAD GRAVE NI PONE EN RIESGO LA VIDA.

Correctamente tratada y manejada es una patología que puede llegar a curarse. Sin embargo, a veces no son fáciles de erradicar completamente.



CITAS

Tenerife 922 257 820

Las Palmas 928 244 713



¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
¡CONTACTA!

